

Vorbereiding diagnostisch longfunctieonderzoek

Zorg ervoor dat u:

- Op tijd komt, zodat u even kunt bijkomen in de wachtruimte. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint.
- Een uur voor de test niet rookt.
- Vier uur voor de test geen alcohol drinkt.
- Dertig minuten voor de test geen zware lichamelijke inspanning verricht.
- Twee uur voor de test geen zware maaltijd nuttigt.
- Geen knellende kleding draagt.
- Bepaalde medicatie enige tijd voor het onderzoek niet gebruikt:

8 uur vooraf

Airomir, Salbutamol, Ventolin.

12 uur vooraf

Atrovent, Berodual, Bricanyl, Combivent, Fenoterol+Ipratropium, Ipratropium, Salbutamol+Ipratropium, Terbutaline.

36 uur vooraf

Acidinium, Acidinium + Formoterol, Acrivastine, Aerivo, Aerivio, AirFluSal Forspiro, Atimos, Bufolar Easyhaler, Busalair, Duaklir Genuair, DuoResp Spiromax, Eklira Genuair, Elpenhaler, Flutiform, Foradil, Formoterol, Formoterol + Beclomethason, Formoterol + Budesonide, Formoterol + Fluticason, Foster, Montelukast, Oxis, Salmeterol, Salmeterol + Fluticason, Semprex, Seretide, Serevent, Singulair, Symbicort.

48 uur vooraf

Daxas, Fluticasonfuroaat/Vilanterol, Indacaterol. Olodaterol, Onbrez, Relvar Ellipta, Roflumilast, Striverdi, Theofylline, Theolair Retard, Unilair

1 week vooraf

Anoro, Beclometasondipropionaat/Formoterolfumaraatdihydraat/Glycopyrronium, Bevespi Aerosphere, Budesonide/Glycopyrronium/Formoterolfumaraatdihydraat, Glycopyrronium, Glycopyrronium/Formoterol, Incruse Ellipta, Indacaterol/Glycopyrronium, Seebri, Spiriva, Spiolto, Tiotropium, Tiotropium/Olodaterol, Trelegy Ellipta, Triotus Zonda, Trimbrow, Trixeo Aerosphere, Ultibro, Umeclidinium, Umeclidinium/vilanterol, Xoterna.

6 weken vooraf

Prednisolon / antibiotica

Niet nodig om te staken:

Alvesco, Beclometason, Budesonide, Ciclesonide, Flixotide, Fluticasonpropionaat, Pulmicort, Qvar.

Neem gerust contact op wanneer u twijfelt over uw medicatie of wanneer staken niet mogelijk is.